

Міністерство освіти і науки України  
Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

## **III етап Всеукраїнської олімпіади з математики**

### **LXXIV Київська міська олімпіада юних математиків**

*Умови та вказівки до розв'язань задач*

*2 тур*

*27 січня 2019 року*

*"Я всіх розумніший, але то не помітно"*  
*Наталія Резнік*

## 7 клас

1. Знайдіть усі пари натуральних чисел  $(a, b)$ , що задовольняють рівності:

$$ab^3 + a^3 + b + 1 = 2019.$$

(Рожкова Марія)

**Відповідь.**  $a = 2, b = 10$ .

**Розв'язання.** З умов задачі зрозуміло, що обидві невідомі – парні, бо інакше маємо рівність парного та непарного чисел. Позначимо через  $a = 2n$  та  $b = 2k \Rightarrow$

$$2n \cdot 8k^3 + 8n^3 + 2k = 2018 \text{ або } 8nk^3 + 4n^3 + k = 1009.$$

Далі можна зрозуміти, що  $k$  обов'язково має бути непарним, і зараз доволі просто все розв'язати простим невеликим перебором.  $nk^3 \leq \frac{1009}{8}$  або  $k^3 \leq 125$ .

Таким чином залишається рівно три варіанти.

$k = 5 \Rightarrow 1000n + 4n^3 = 1004 \Rightarrow n = 1$  задовольняє умову. При більших  $n$  ліва частина стає більшою за 1004.

$k = 3 \Rightarrow 64n + 4n^3 = 1006 \Rightarrow$  розв'язків немає, бо ліва частина ділиться на 4, а права – ні.

$k = 1 \Rightarrow 8n + 4n^3 = 1008 \Rightarrow 2n + n^3 = 252 \Rightarrow n = 2m \Rightarrow 4m + 8m^3 = 252 \Rightarrow m + 2m^3 = 63$ . Залишається розібрати три випадки по  $m$ , оскільки з останньої рівності очевидно, що  $m \leq 3$ .  $m = 1, m = 2$  та  $m = 3$  умови не задовольняє.


Тому шукана пара єдина,  $k = 5$  та  $n = 1 \Rightarrow b = 10$  та  $a = 2$ .

2. Андрій та Олеся грають в таку гру. На числовому промені зліва направо написані у вказаному порядку усі натуральні числа: 1, 2, 3, .... Вони по черзі, розпочинає Олеся, послідовно, починаючи з 1, викреслюють записані числа за такими правилами – якщо на попередньому ході один з гравців викреслив  $n$  послідовних чисел, то інший гравець наступним ходом може викреслити або  $n + 1$ , або  $n - 1$  (якщо число  $n - 1$  – натуральне) натуральне число, починаючи з першого не викресленого. Перед початком гри Андрій визначає число  $k \geq 2019$ . Перемагає в грі той з гравців, хто своїм ходом викреслить число  $k$ . Хто перемаже за правильної гри обох гравців, якщо Олеся першим ходом може викреслити від 1 до 10 перших чисел?

(Рубльов Богдан)

**Відповідь:** Олеся.

**Розв'язання.** Першим ходом Олеся викреслює одне число (зрозуміло, що то буде число 1). Тоді Андрій може викреслити тільки 2 наступних числа. І надалі Олеся бере кожним викреслює 1 число. Таким чином перед кожним своїм ходом Олеся має ситуацію, коли викреслені перші 3, 6, ...,  $3m$  чисел. Нехай  $k = 3q + r, r = 1, 2, 3$ . Якщо  $r = 1, 3$ , то Олеся своєю стратегією доводить ситуацію, коли перед її ходом залишається  $r$  чисел, які вона й викреслює разом з числом  $k$  і перемагає. Якщо  $r = 2$ , то Олеся викреслює 3 числа, серед яких і число  $k$ .



**Рис. 1**

3. У чотирикутнику  $ABCD$  відомо, що  $\angle ABD = \angle DBC$  та  $AD = CD$ . Нехай  $DH$  – висота  $\triangle ABD$ . Доведіть, що  $|BC - BH| = HA$ .


(Хілько Данило)

**Розв'язання.** Відкладемо на промені  $BA$  відрізок  $BE = BC$ . Якщо точка  $E$  лежить на відрізку  $AB$  (рис. 1), то  $\triangle BCD = \triangle BED$  за двома сторонами і кутом між ними. Тоді  $AD = CD = ED$ , звідки  $\triangle ADE$  є рівнобедреним. В ньому  $HD$  висота, а тому й медіана. Тепер маємо, що

$$AH = HE = HB - BE = HB - BC \Rightarrow BC = BH - HA,$$

Якщо точка  $A$  лежить на відрізку  $BE$  (рис. 2), то аналогічно  $\triangle BCD = \triangle BED$  і

$$AH = HE = BE - HB = BC - HB \Rightarrow BC = BH + HA.$$



**Рис. 2**

4. Знайдіть дріб, що є найбільшим серед усіх 1010 наведених:

$$\frac{1}{2019}, \frac{1+2018}{2019+2}, \frac{1+2018+3}{2019+2+2017}, \frac{1+2018+3+2016}{2019+2+2017+4}, \frac{1+2018+3+2016+5}{2019+2+2017+4+2015}, \dots$$

$$\frac{1+2018+3+2016+\dots+1009}{2019+2+2017+4+\dots+1011}, \frac{1+2018+3+2016+\dots+1009+1010}{2019+2+2017+4+\dots+1011+1010}.$$

(Рубльов Богдан)

**Відповідь:** найбільшими є 2-й, 4-й, ..., 1010-й дробі.

**Розв'язання.** Розіб'ємо природнім чином усі дробі на дві групи – ті, що стоять на непарних місцях та ті, що на парних.

$$a_1 = \frac{1}{2019},$$

$$a_2 = \frac{1+2018+3}{2019+2+2017} = \frac{1+2021}{2019+2019},$$

$$a_3 = \frac{1+2018+3+2016+5}{2019+2+2017+4+2015} = \frac{1+2021+2}{2019+2019+2}, \dots,$$

$$a_{505} = \frac{1+2018+3+2016+5+\dots+1012+1009}{2019+2+2017+4+2015+\dots+1008+1011} = \frac{1+2021+504}{2019+2019+504}.$$

$$b_1 = \frac{1+2018}{2019+2} = \frac{2019}{2021},$$

$$b_2 = \frac{1+2018+3+2016}{2019+2+2017+4} = \frac{2019+2}{2021+2} = \frac{2019}{2021},$$

$$b_3 = \frac{1+2018+3+2016+5+2014}{2019+2+2017+4+2015+6} = \frac{2019+3}{2021+3} = \frac{2019}{2021}, \dots,$$

$$b_{505} = \frac{1+2018+3+2016+5+\dots+1012+1009+1010}{2019+2+2017+4+2015+\dots+1008+1011+1010} = \frac{2019+505}{2021+505} = \frac{2019}{2021}.$$

Таким чином усі дробі, що позначені як  $b_i$ ,  $i = 1, 505$  приймають однакові значення, які дорівнюють  $\frac{2019}{2021}$ . Порівняємо тепер дробі  $a_k$  та  $a_{k+1}$ :

$$a_{k+1} - a_k = \frac{1+2021k}{2019+2019k} - \frac{1+2021(k-1)}{2019+2019(k-1)} = \frac{(1+2021k)(2021+2021(k-1)) - (1+2021(k-1))(2021+2021k)}{(2019+2019(k-1))(2019+2019k)} > 0 \Leftrightarrow$$

$$2021 + 2021 \cdot (k-1) + 2021^2 k + 2021^2 k(k-1) -$$

$$- 2021 - 2021 \cdot k - 2021^2 (k-1) - 2021^2 k(k-1) = 2021^2 - 2021 > 0$$

Таким чином найбільшим дробом буде або  $\frac{2019}{2021}$  або  $a_{505} = \frac{1+2021+504}{2019+2019+504}$ . Порівняємо тепер їх.

$$\frac{1+2021+504}{2019+2019+504} - \frac{2019}{2021} = \frac{(1+2021+504) \cdot 2021 - (2019+2019+504) \cdot 2019}{(2019+2019+504) \cdot 2021} < 0 \Leftrightarrow$$

$$2021 + 2021 \cdot 2021 \cdot 504 - 2019^2 - 2019^2 \cdot 504 =$$

$$= 2021 + (2021^2 - 2019^2) \cdot 504 - 2019^2 = 2021 + 8080 \cdot 504 - 2019^2 = -2020 < 0.$$


3.1. Вчителька на дошці нарисувала координатну площину та позначила деякі точки на цій площині. На жаль, двійочник Вася, що був черговим, витер майже весь рисунок, окрім двох точок  $A(1; 2)$  та  $B(3; 1)$ . Чи зможе відмінник Андрійко за цими двома

точками побудувати початок системи координат точку  $O(0; 0)$ ? На дошці точка  $A$  розташована вище та лівіше за точку  $B$ .

**Відповідь:** може.

**Розв'язання.** Розглянемо трикутники  $CBE$  та  $OBD$  (рис. 3). Вони прямокутні та мають рівні катети, тому вони також рівні, звідки  $CB = OB$ . Аналогічно доводиться, що  $AC = AB = OA$ . Тоді  $\triangle OCB$  – рівнобедрений, в якому відрізок  $BA$  є медіаною, а тому й висотою.

Тепер алгоритм побудови такий: будуємо пряму  $OC \perp AB$ , що проходить через точку  $A$ . Відкладаємо на цій прямій відрізки  $AO = AB$  та  $AC = AB$ . Точка  $O$  розташована нижче ніж точка  $C$ .



**Рис. 3**

**4.1.** Число 1000 розбили на 9 не обов'язково різних доданків. Після цього виписали усі різні числа, які можна отримати, якщо додати деякі з цих доданків (від одного до восьми). Яка найменша кількість чисел може бути виписаною?

**Відповідь:** 9 різних чисел.

**Розв'язання.** Розіб'ємо 1000 на 8 чисел 100 та одне число 200. У такому випадку сума доданків може приймати 9 різних значень  $100 \cdot 1, 100 \cdot 2, \dots, 100 \cdot 9$ .

Доведемо, що неможна отримати менше 9 різних чисел: оскільки 1000 не ділиться на 9, тобто в нас буде принаймні 2 різних числа. Упорядкуємо усі числа за зростанням. Спочатку виберемо тільки перше, далі – тільки перше та друге, далі перше, друге та третє, і так далі, наприкінці виберемо перші 8 чисел – і так ми отримаємо 8 різних сум. Тепер візьмемо останні 8 чисел – нова сума більша за усі попередні, тому на дошці виявилось не менше 9 різних чисел.

## 8 клас


**1.** З пунктів  $A$  та  $B$  назустріч один одному виїхали два велосипедисти зі швидкостями  $v_1$  та  $v_2$ , де  $v_1 \geq v_2$ , і вперше зустрілися через 1 годину. Після зустрічі вони без зупинок продовжили рух до кінцевих пунктів. Якщо хтось із них доїхав до свого кінцевого пункту, то він розвертався та їхав у зворотному напрямі. Через який час після першої зустрічі відбулася їхня друга зустріч?

(Фольклор)

**Відповідь:** якщо  $v_1 < 2v_2$ , то через 2 години, інакше через

$$\frac{2v_2}{v_1 - v_2} \text{ годин.}$$

**Розв'язання.** До першої зустрічі перший велосипедист проїхав шлях  $S_1 = v_1$ , а другий –  $S_2 = v_2$ . Тобто відстань між пунктами  $A$  та  $B$  дорівнює  $v_1 + v_2$ . Можливі два варіанти.



**Рис. 4**

До другої зустрічі обидва досягли кінцевих пунктів та розвернулися. Нехай друга зустріч відбулася на відстані  $S_3$  від пункту  $B$  і через час  $t_2$  після першої зустрічі (рис. 4). Тоді маємо такі рівності:

$$v_2 + S_3 = v_1 t_2 \text{ та } v_1 + (v_1 + v_2 - S_3) = v_2 t_2.$$

Додамо ці рівності і матимемо, що

$$v_2 + S_3 + 2v_1 + v_2 - S_3 = (v_2 + v_1)t_2 \Rightarrow t_2 = 2.$$


До другої зустрічі перший досяг свого кінцевого пункту Б, розвернувся та догнав другого до того моменту, коли той досяг пункту А (рис. 5). Нехай друга зустріч відбулася на відстані  $S_3$  від пункту Б і через час  $t_2$  після першої зустрічі.

Тоді маємо такі рівності:

$$S_3 - v_2 = v_2 t_2 \text{ та } v_2 + S_3 = v_1 t_2.$$

Розглянемо різницю цих рівностей і матимемо, що

$$v_2 + S_3 + v_2 - S_3 = (v_1 - v_2)t_2 \Rightarrow t_2 = \frac{2v_2}{v_1 - v_2}.$$



**Рис. 5**

Залишається зрозуміти, за яких умов на  $v_1, v_2$  буде який з випадків. Перший випадок чинний, коли перший досягне А пізніше ніж другий. Тобто  $\frac{v_2 + v_2 + v_1}{v_1} > \frac{v_1}{v_2} \Rightarrow 2v_2^2 + v_1 v_2 > v_1^2$ . Позначимо через  $x = \frac{v_1}{v_2}$ , тоді матимемо, що має справджуватися нерівність:

$$x^2 - x - 2 < 0 \Rightarrow (x+1)(x-2) < 0 \Rightarrow x < 2, \text{ тобто } v_1 < 2v_2.$$

2. У країні була така система автошляхів, що вони перетиналися лише у містах і не перетиналися між містами. При цьому з кожного міста можна було дітстатися до кожного іншого, якщо кожною дорогою можна було рухатися в обох напрямках. Між кожними двома містами не може бути більше однієї прямої дороги, що безпосередньо їх з'єднує. Уряд вирішив кожную дорогу зробити з одностороннім рухом, тобто якщо міста А та В з'єднані дорогою, то можна дістатися цією дорогою або з А в В, або навпаки. При цьому, для кожного міста повинна існувати принаймні одна дорога, якою з цього міста можна було б виїхати, та принаймні одна дорога, якою в це місто можна було б заїхати. Чи обов'язково в цій країні буде місто з якого, можливо через інші міста, можна дістатися до будь-якого іншого, або місто, до якого можна дістатися, з будь-якого іншого міста, також можливо через інші міста?


(Фольклор)

**Відповідь:** не обов'язково.

**Розв'язання.** Покажемо, як може бути налаштована система шляхів, щоб відповідного міста не існувало. Позначимо через А, В, С, D трійки міст, в яких шляхи утворені за циклом, наприклад,  $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow A_1$  (рис. 6).

Таким чином досягається те, що з кожного міст виходить та заходить принаймні одна дорога. Далі організуємо ще такі дороги з вказуванням напрямку:  $A_1 \rightarrow B_1, C_1 \rightarrow B_1$  та  $C_1 \rightarrow D_1$ . Тоді до кожного міста груп А та С не можна дістатися з інших групи, до кожного міста групи В не можна дістатися з групи D та навпаки.

Так само звідси впливає і що з кожного міста кожної групи неможливо дістатися й до кожного іншого.



**Рис. 6**

3. Знайдіть усі трійки натуральних чисел  $(m, n, k)$ , що задовольняють рівності:

$$(m!+m)(n!+n) = (k!+k).$$

Тут через  $k!$  для натурального числа  $k$  позначений добуток  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k$

(Николаев Арсеній)

**Відповідь:**  $n = m = 1, k = 2$ .

**Розв'язання.** Очевидно з умови, що  $k > m$  та  $k > n$ . Перепишемо задане рівняння таким чином:

$$mn((m-1)!+1)((n-1)!+1) = k((k-1)!+1).$$

Оскільки  $(k-1)!$  ділиться на  $m$  та  $n$ , то  $(k-1)!+1$  не ділиться на жодний дільник цих чисел. Тому  $k : mn$ . Нехай  $n \geq m$ . Якщо  $m \geq 2$ , то

$$\begin{aligned} 4(n!)^2 &\geq 4m!n! = (2m!)(2n!) \geq (m!+m)(n!+n) = k!+k > (mn)! \geq (2n)! \Rightarrow \\ 4n!n! &> (2n) \cdot (2n-1) \cdot \dots \cdot (n+1) \cdot n! \Rightarrow 4n! > (2n) \cdot (2n-1) \cdot \dots \cdot (n+1) \Rightarrow \\ 4n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 &> (2n) \cdot (2n-1) \cdot (2n-2) \cdot \dots \cdot (n+2) \cdot (n+1) / \\ 4 &> \frac{2n}{n} \cdot \frac{2n-1}{n-1} \cdot \dots \cdot \frac{n+1}{1} - \text{суперечність при } n \geq 2. \end{aligned}$$

Покажемо, що при  $n \geq 2$  це є суперечністю. Кожний множник окрім першого та останнього у правій частині більше. А тепер покажемо, що й добуток першого та останнього множників так само більше у правій частині:  $4n \cdot 1 > (2n) \cdot (n+1) > 6n$ .

Таким чином лишається єдиний можливий варіант  $m = 1$ , звідси

$$2 \cdot n! + 2n = k! + k \geq (n+1)! + (n+1) > (n+1)! + n \Rightarrow n > n!(n-1) \Rightarrow n = 1 \Rightarrow m = 1.$$


Далі просто знаходимо, що  $k = 2$ .

**4.** У трикутнику  $ABC$  відомо, що  $\angle A = 75^\circ$ ,  $\angle C = 45^\circ$ . На промені  $BC$  за точку  $C$  взято точку  $T$  так, що  $BC = CT$ . Нехай  $M$  – середина відрізка  $AT$ . Знайдіть величину  $\angle BMC$ .

(Тригуб Антон)

**Відповідь:**  $\angle BMC = 45^\circ$ .

**Розв'язання.** Зрозуміло, що  $CM$  є середньою лінією  $\triangle TAB$  (рис. 7). Відкладемо відрізок  $MK$  на промені  $CM$  за точку  $M$  такий, що  $CM = MK$ . Тоді  $AB = CK$  та  $AB \parallel CK$ . Тоді  $ABCK$  – паралелограм. Відкладемо на промені  $CA$  за точку  $A$  таку точку  $S$ , що  $\angle SKC = 15^\circ$ . Тоді  $\triangle SKC$  є рівнобедреним, а тому  $\angle SMC = 90^\circ$ . Нехай нарешті точка  $L = SK \cap AB$ . Тоді чотирикутник  $LACK$  є рівнобічною трапецією, звідки  $AK = LC$ . З



**Рис. 7**

іншого боку,  $BC = AK \Rightarrow BC = CL$ . Тоді  $\triangle BLC$  є рівнобедреним з кутом  $\angle BLC = 60^\circ$ . Тоді цей трикутник є правильним, звідки  $BC = BL$ . Доведемо, що  $BS = BC$ , тобто, що точки  $S, L, C$  лежать на колі з центром  $B$ . Але це випливає з того, що  $\angle LSC = 30^\circ = \frac{1}{2} \angle LBC$ . Справді, якщо  $X$  – точка на колі з центром  $B$  і радіусом  $BC$ , то точки  $S, L, C$  лежать на одному колі з точкою  $X$ . А точки  $X, L, C$  лежать на колі з центром  $B$ . Отже, ми довели, що  $BS = BC$ . Тоді  $\angle SBC = 180^\circ - 2\angle BCA = 90^\circ$ . Звідси точки  $S, B, C, M$  лежать на одному колі, а також  $\angle BMC = \angle BSC = 45^\circ$ , що й треба було довести.

**3.1.** Знайдіть найменше натуральне число вигляду  $\overline{30x070y03}$ , що ділиться на 37, де  $x, y$  – цифри.

**Відповідь:** 300070703.

**Розв'язання.** Запишемо шукане число таким чином:

$$\overline{30x070y03} = 300070003 + 10^6 x + 10^2 y = 37 \cdot (8110000 + 27027x + 3y) + (3 + x - 11y).$$


Таким чином  $3 + x - 11y$  має бути кратним 37 при найменшому  $x$ . Оскільки  $x, y$  – цифри, то зрозуміло, що цей вираз може приймати значення  $0, -37, -74$ . Для кожного з них маємо такі розв'язання.

$$3 + x - 11y = 0 \Rightarrow y = 1 \text{ та } x = 8.$$

$$3 + x - 11y = -37 \Rightarrow y = 4 \text{ та } x = 4.$$

$$3 + x - 11y = -74 \Rightarrow y = 7 \text{ та } x = 0.$$

Звідси найменшим з них є число 300070703.



**Рис. 8**

**4.1.** Через вершини  $A, B$  паралелограма  $ABCD$  проведене коло, що вдруге перетинає діагоналі  $BD$  та  $AC$  у точках  $X$  та  $Y$  відповідно. Описане коло  $\triangle ADX$  перетинає діагональ  $AC$  вдруге в точці  $Z$ . Доведіть, що  $AZ = CZ$ .

**Розв'язання.** З того, що точки  $A, X, Z, D$  лежать на одному колі, а  $A, B, X, Y$  – на іншому (рис. 8), то

$$\angle AYB = \angle AXB = 180^\circ - \angle AXD = 180^\circ - \angle AZD = \angle DZC.$$

Оскільки  $ABCD$  – паралелограм, то  $\angle BAY = \angle DCZ$ , звідки  $\triangle ABY = \triangle CDZ$ , звідки й маємо шукану рівність сторін.

## 9 клас

**1.** Знайдіть усі дійсні значення  $k$ , для яких усі корені рівняння  $k(2-k)x^2 - (k+4)x + 6 = 0$  є натуральними числами.

(Фольклор)

**Відповідь:**  $k = 2, \frac{1}{2}, 1$ .

**Розв'язання.** Розглянемо спочатку випадки, коли це рівняння не є квадратним.

При  $k = 0$  рівняння набуває вигляду  $-4x + 6 = 0$  – має не натуральний корінь.

При  $k = 2$  рівняння набуває вигляду  $-6x + 6 = 0$  – має єдиний корінь  $x = 1$  – умову задовольняє.

Нехай тепер  $k(2-k) \neq 0$ . Знайдемо дискримінант квадратного рівняння:

$$D = (k^2 + 8k + 16) - 24(2k - k^2) = 25k^2 - 40k + 16 = (5k - 4)^2 \Rightarrow$$

$$x_{1,2} = \frac{(k+4) \pm (5k-4)}{2k(2-k)} = \frac{6k}{2k(2-k)} = \frac{3}{2-k}; \frac{-4k+8}{2k(2-k)} = \frac{2}{k}.$$

Залишається перебрати випадки, коли ці числа натуральні. Нехай  $\frac{2}{k} = m$  – натуральне, тоді  $k = \frac{2}{m}$

$\Rightarrow \frac{3}{2-k} = \frac{3m}{2(m-1)}$  – натуральне число. Оскільки  $m$  – натуральне, то числа  $m$  та  $m-1$  взаємно прості.

Тому остання умова можлива, якщо  $m-1=1 \Rightarrow k=1$  або  $m-1=3 \Rightarrow k=\frac{1}{2}$ .

**2.** Задача 2 для 8 класу.

3. Рівносторонній трикутник  $ABC$  вписано в коло  $w$ . Точки  $F$  та  $E$  на сторонах  $AB$  та  $AC$  відповідно обираються таким чином, щоб виконувалась умова  $\angle ABE + \angle ACF = 60^\circ$ . Описане коло  $\triangle AFE$  вдруге перетинає коло  $w$  в точці  $D$ . Промені  $DE$  та  $DF$  перетинають пряму  $BC$  у точках  $X$  та  $Y$  відповідно. Доведіть, що центр вписаного кола  $\triangle DXY$  не залежить від вибору точок  $F$  і  $E$ .

(Хилько Данило)

**Розв'язання.** Позначимо точку перетину відрізків  $CF$  та  $BE$  – точку  $P$ . Маємо  $\angle CBE = 60^\circ - \angle ABE = \angle FCA$ . Аналогічно,  $\angle FCB = \angle ABE$  (рис. 9). Тоді  $\angle FKE = \angle CKB = 180^\circ - \angle CBE - \angle FCB = 120^\circ$ .

Отже, чотирикутник  $AFPE$  вписаний в коло  $\gamma$ , на якому лежить точка  $D$ . Проведемо бісектрису кута  $\angle CAB$  до перетину з  $\gamma$  у деякій точці  $O$ . Зрозуміло, що  $O$  – це середина меншої дуги  $EF$  кола  $\gamma$ . Доведемо, що  $O$  – центр правильного  $\triangle ABC$ . Маємо, що  $\triangle AFC = \triangle BEC$  рівні за стороною та двома прилеглими кутами. Звідси  $FC = BE$ . Зрозуміло, що  $\angle OFC = \angle OEB$  та  $OF = OE$ . Звідси  $\triangle OFC = \triangle OEB$  за двома сторонами та кутом між ними, а тому  $\angle PBO = \angle PCO$ , тобто чотирикутник  $BPOC$  вписаний, звідки  $\angle BOC = 120^\circ$ . Отже, точка  $O$  лежить на бісектрисі кута  $\angle CAB$  в одній півплощині з точкою  $P$  відносно прямої  $BC$  та  $\angle BOC = 120^\circ$ . Зрозуміло, що тоді  $O$  – центр трикутника  $\triangle ABC$ .




Рис. 9

Доведемо тепер, що  $O$  є інцентром  $\triangle DXY$ . Зрозуміло, що тоді цей центр не залежить від точок  $E$  та  $F$ . Очевидно,  $\angle YDO = \angle XDO = 30^\circ$ , тобто  $DO$  – бісектриса  $\angle XDY$ . Достатньо показати, що  $YO$  – бісектриса  $\angle DYX$ . Маємо, що  $\angle YDO = \angle OBY = 30^\circ$ , звідси чотирикутник  $DOYB$  вписаний і  $DO = OB$ , як радіуси. Отже,  $\angle OYX = \angle ODB = \angle DBO = \angle DYO$ , тобто  $YO$  – справді бісектриса  $\angle DYX$ .

4. Знайдіть усі такі натуральні  $n$ , та прості числа  $p, q$ , що задовольняють рівності:

$$n^3 = p^3 + 2p^2q + 2pq^2 + q^3.$$

(Рубльов Богдан)

**Відповідь:** таких чисел не існує.

**Розв'язання.** Перепишемо задану рівність таким чином:

$$n^3 = p^3 + 2p^2q + 2pq^2 + q^3 = (p+q)(p^2 + pq + q^2).$$



Зрозуміло, що  $p \neq q$ , бо інакше справджувалася би умова  $n^3 = 6p^3$ , що неможлива для натуральних чисел.

Припустимо, що існує  $s > 1$ , що є дільником кожного з множників  $p + q$  та  $(p^2 + pq + q^2)$ . Але тоді  $s \mid (p + q)^2 - (p^2 + pq + q^2) = pq$ . Якщо, наприклад,  $s \mid p$ , то з умови  $s \mid (p + q)$  випливає, що й  $s \mid q \Rightarrow$  з простоти  $p, q$  випливає, що  $p = q$ , що призводить до суперечності.

Якщо ж  $((p + q), (p^2 + pq + q^2)) = 1$ , то звідси випливає, що кожний множник має бути кубом натурального числа. Нехай тоді  $p + q = x^3$  та  $p^2 + pq + q^2 = y^3$  та  $n = xy$ . Тоді

$$pq = (p + q)^2 - (p^2 + pq + q^2) = x^6 - y^3 = (x^2 - y)(x^4 + x^2y + y^2).$$

Оскільки  $x^4 + x^2y + y^2 > x^3 = p + q$ , то звідси випливає, що  $x^4 + x^2y + y^2 = pq$  та  $x^2 - y = 1 \Rightarrow$

$$pq = x^4 + x^2(x^2 - 1) + (x^2 - 1)^2 = 3x^4 - 3x^2 + 1 = 3x^2(x - 1)(x + 1) + 1 \equiv 1 \pmod{9},$$

оскільки  $x(x - 1)(x + 1) \div 3$ .

Залишається перебрати варіанти за модулем 9, куб цілого числа може за модулем 9 дорівнювати  $0, \pm 1$ . Подивимось на наші випадки можливих остач за модулем 9 простих чисел  $p, q$ , щоб виконувалась одержана умова  $pq \equiv 1 \pmod{9}$ .

$$p \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow q \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow x^3 = p + q \equiv 2 \pmod{9} - \text{суперечність.}$$

$$p \equiv 2 \pmod{9} \Rightarrow q \equiv 5 \pmod{9} \Rightarrow x^3 = p + q \equiv 7 \pmod{9} - \text{суперечність.}$$

$$p \equiv 4 \pmod{9} \Rightarrow q \equiv 7 \pmod{9} \Rightarrow x^3 = p + q \equiv 2 \pmod{9} - \text{суперечність.}$$

$$p \equiv 8 \pmod{9} \Rightarrow q \equiv 8 \pmod{9} \Rightarrow x^3 = p + q \equiv 7 \pmod{9} - \text{суперечність.}$$

Усі варіанти перебрані, що завершує доведення того, що таких чисел не існує.

**3.1.** Коло  $k$  радіуса  $r$  вписане в  $\triangle ABC$ , дотичні до кола  $k$ , що паралельні відповідно сторонам  $AB, BC$  та  $CA$  перетинають інші сторони  $\triangle ABC$  у точках  $M, N; P, Q$  та  $L, T$  ( $P, T \in AB, L, T \in BC$  та  $M, Q \in AC$ ). Позначимо через  $r_1, r_2, r_3$  - радіуси вписаних кіл у трикутники  $MNC, PQA$  та  $LTB$ . Доведіть, що  $r_1 + r_2 + r_3 = r$ .

**Розв'язання.** Оскільки усі трикутники подібні, то:


$$\frac{r_1 + r_2 + r_3}{r} = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{p}.$$

Неважко зрозуміти, що (рис. 10)

$$\begin{aligned} 2p_1 &= CM + CN + MN = CM + CN + MZ + ZN = \\ &= CM + MX + CN + NY = \\ &= 2p - (AX + AB + BY) = 2p - 2c. \end{aligned}$$

Таким чином

$$\frac{r_1 + r_2 + r_3}{r} = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{p} = \frac{p - a + p - b + p - c}{p} = \frac{3p - 2p}{p} = 1.$$



**Рис. 10**

**4.1.** Знайдіть усі такі натуральні числа  $n$ , що мають принаймні 4 дільники та саме число  $n$  дорівнює сумі квадратів чотирьох найменших дільників.

**Відповідь:**  $n = 130$ .

**Розв'язання.** Позначимо ці найменші дільники через  $a < b < c < d$ , тоді справджується така рівність:  $n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ . Звідси зрозуміло, що  $n$  – парне. Тоді  $a = 1, b = 2$ . Якщо  $4 \mid n$ , то з  $c, d$  – одне дорівнює 4. Друге має бути непарним, бо інакше вийде  $n$  непарним, що неможливо. Тому в сумі  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$  два парних числа і два непарних дають за модулем 4 остачу 2, а це суперечить тому, що ліва частина кратна 4. Таким чином 4 не є дільником  $n$ .

Дільник  $c$  не може бути парним, о інакше дільник  $\frac{1}{2}c < c$ . Таким чином  $c$  – непарне, а  $d$  – парне. Звідси зрозуміло, що  $d = 2c$ . Тоді  $n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 5 + 5c^2$ . Але варіант  $c = 3, d = 5$  неможливий, тому  $c = 5 \Rightarrow d = 10$  та  $n = 5 + 5c^2 = 130$ .

## 10 клас

**1.** Відомо, що обидва дійсні корені квадратного тричлену  $g(x) = x^2 - 3x + a$  є коренями многочлена  $f(x) = x^3 - x^2 + cx + 4$ , аналогічно обидва дійсні корені квадратного тричлену  $h(x) = x^2 + x + b$  також є коренями многочлена  $f(x)$ . Чому може дорівнювати значення  $f(1)$ ?

(Фольклор)

**Відповідь:** 0.

**Розв'язання.** Оскільки  $f(x)$  – кубічний многочлен, то він має не більше трьох коренів, тому квадратні тричлени  $g(x)$  та  $h(x)$  мають спільний корінь. Позначимо його через  $t$ , тоді

$$g(t) = t^2 - 3t + a = 0 \text{ та } h(t) = t^2 + t + b = 0 \Rightarrow 4t + b - a = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{4}(a - b).$$

Тоді має справджуватися рівність:  $f(x)(x - t) = g(x)h(x)$ .

$$(x^3 - x^2 + cx + 4)(x - t) = (x^2 - 3x + a)(x^2 + x + 2).$$

Якщо зібрати коефіцієнти при  $x^3$  матимемо, що має справджуватися рівність:

$$-1 - t = -3 + 1 \Rightarrow t = 1, \text{ звідки } f(1) = f(t) = 0.$$

Неважко знайти і явний вигляд многочленів  $f, g$  та  $h$ , що задовольняють наведені умови:

$$f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4, g(x) = x^2 - 3x + 2 \text{ та } h(x) = x^2 + x - 2.$$

**2.** Задана нескінченна послідовність, що складається з букв  $a$  та  $b$ . В цій послідовності можна зробити таку заміну літер  $abb \rightarrow baa$ . Відомо, що в якому б порядку не робити такі заміни, їх вдасться зробити лише скінченну кількість разів. Доведіть, що тоді в цій послідовності заміни  $aabb \rightarrow bbaa$  так само можна буде зробити лише скінченну кількість разів.

(Ніколаєв Арсеній)


**Розв'язання.** З того, що змін може бути скінченна кількість, то існує номер  $N$ , починаючи з якого заміни не можливі. Це означає, що там немає жодної пари букв  $b$ , що стоять поруч. Бо інакше, зліва від них стоїть буква  $a$  і можливе перетворення. Але тоді і другу підстановку зробити не можна, бо,

починаючи з номера  $N$ , там немає пари букв  $b$ . А усі інші пари букв  $b$  при другій підстановці за кожний хід зсовуються наліво. А таких ходів можна зробити лише скінченну кількість.

**3.** Позначимо у трикутнику  $ABC$  через  $T_A, T_B, T_C$  – точки дотику зовнівписаних кіл  $\triangle ABC$  до сторін  $BC, AC$  та  $AB$  відповідно. Нехай  $O$  – центр описаного кола  $\triangle ABC$ , а  $I$  – центр вписаного кола. Відомо, що  $OI \parallel AC$ . Доведіть, що  $\angle T_A T_B T_C = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle ABC$ .

(Тригуб Антон)

**Розв’язання.** Нехай  $I_A, I_B, I_C$  – центри зовні вписаних кіл,  $I_1$  – точка, симетрична точці  $I$  відносно точки  $O$  (рис. 11). Розглянемо  $\triangle I_A I_B I_C$ . Тоді  $I$  є ортоцентром цього трикутника, оскільки бісектриси зовнішнього і внутрішнього кута перпендикулярні. Зрозуміло також, що  $O$  є центром кола Ейлера цього трикутника. Тоді точка  $I_1$  є центром описаного кола  $\triangle I_A I_B I_C$ . В такому разі  $\angle I_1 I_B C = \angle I_C I_B B$ , звідки  $I_1 I_B \perp AC$ , оскільки  $\angle B I_C A = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle B C A = \angle A C I_B$ . Тобто прямі  $I_B T_B, I_A T_A$  та  $I_C T_C$  перетинаються в точці  $I_1$ .



**Рис. 11**


Зрозуміло, що  $AI_1C$  – трапеція. Точки  $I, I_1$  симетричні відносно серединного перпендикуляру  $AC$ , оскільки  $II_1 \parallel AC$ . Тоді  $AI_1C$  – рівнобічна трапеція і  $\angle AI_1C = \angle AIC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle ABC$ . Помітимо також, що чотирикутники  $I_1 T_C A T_B$  і  $I_1 T_A C T_B$  – вписані. Тоді:

$$\angle T_A T_B T_C = \angle T_C T_B I_1 + \angle I_1 T_B T_A = \angle I_1 A B + \angle I_1 C B = \angle A I_1 A C - \angle A B C = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A B C.$$

**4.** Задача 4 для 9 класу.

**3.1.** Нехай  $ABCDE$  правильний п'ятикутник з центром  $M$ . Точка  $P \neq M$  обрана на відрізку  $MD$ . Описане коло  $\triangle ABP$  перетинає вдруге пряму  $AE$  у точці  $Q$ , а пряму, що перпендикулярна  $CD$  та проходить через  $P$ , вдруге у точці  $R$ . Доведіть, що  $AR = QR$ .

**Розв’язання.** Позначимо через  $S = RP \cap AE$  (рис. 12). Неважко порахувати кути:  $\angle BAE = 108^\circ, \angle ABE = \angle AEB = 36^\circ$ . Оскільки  $BE \parallel CD, RP \perp BE$ , то з чотирикутника  $ABXS$  маємо:



$$\angle ASX = 360^\circ - 90^\circ - 144^\circ = 126^\circ.$$

Далі маємо, що  $\angle QSP = \angle ASR = 54^\circ$ . З цього матимемо, що

**Рис. 12**

$$\angle SPA = 54^\circ - \angle SAP = \angle PAB - 54^\circ = 126^\circ - \angle AQP = 126^\circ - \angle SQP = \angle SPQ.$$

Звідси  $ABPQ$  – вписаний, і надалі легко бачити, що  $SP$  – бісектриса  $\angle APQ$ , з чого й випливає рівність відрізків  $AR = QR$ .

**4.1.** Послідовність натуральних чисел  $a_1, a_2, a_3, \dots$  визначається таким чином:  $a_{n+1} = a_n^2 + 2018$ , де  $a_1$  – деяке натуральне число. Доведіть, що в цій послідовності не більше ніж одне число може бути кубом натурального числа.

**Розв'язання.** Припустимо, що там є не менше одного куба натурального числа. Нехай  $a_k$  – найменше із можливих кубів. Тоді за модулем 9 воно дорівнює  $0, \pm 1$ , тому  $a_k^2 \equiv 0, 1 \pmod{9}$ . Далі усі числа вписуємо саме за модулем 9. Розглянемо ці випадки.

$a_k^2 \equiv 0$  та  $a_{k+1} \equiv 2 \Rightarrow a_{k+1}^2 \equiv 4$  та  $a_{k+2} \equiv 6 \Rightarrow a_{k+2}^2 \equiv 0$  та  $a_{k+3} \equiv 2$  і кубів більше не може бути.

$a_k^2 \equiv 1$  та  $a_{k+1} \equiv 3 \Rightarrow a_{k+1}^2 \equiv 0$  та  $a_{k+2} \equiv 2$  і кубів більше не може бути.

## 11 клас

**1.** Знайдіть додатні числа  $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ , що задовольняють умову:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{2019} = a_1 a_2 \dots a_{2019} = \sqrt[2018]{2019^{2019}}.$$

(Мороз Микола)

**Відповідь:**  $a_1 = a_2 = \dots = a_{2019} = \sqrt[2018]{2019}$ .

**Розв'язання.** З нерівності між середніми маємо, що

$$\frac{1}{2019}(a_1 + a_2 + \dots + a_{2019}) \geq \sqrt[2019]{a_1 a_2 \dots a_{2019}} \text{ або } (a_1 + a_2 + \dots + a_{2019})^{2019} \geq 2019^{2019} a_1 a_2 \dots a_{2019}.$$

З умови задачі випливає, що

$$\begin{aligned} (a_1 + a_2 + \dots + a_{2019})^{2019} &= (\sqrt[2018]{2019^{2019}})^{2019} = (2019 \cdot \sqrt[2018]{2019})^{2019} = \\ &= 2019^{2019} \cdot \sqrt[2018]{2019^{2019}} = 2019^{2019} a_1 a_2 \dots a_{2019}, \end{aligned}$$

Тобто в нерівності між середніми справджується рівність, а це можливо лише за умови, що

$$a_1 = a_2 = \dots = a_{2019} = \frac{1}{2019} \cdot 2019 \cdot \sqrt[2018]{2019} = \sqrt[2018]{2019}.$$

**2.** Задача 2 для 10 класу.

**3.** Пряма  $l$  перпендикулярна стороні  $AC$  гострокутного трикутника  $ABC$  і перетинає цю сторону в точці  $K$ , а описане коло  $\Delta ABC$  у точках  $P$  та  $T$  (точка  $P$  по той бік від прямої  $AC$ , що й вершина  $B$ ). Позначимо через  $P_1$  та  $T_1$  – проєкції точок  $P$  та  $T$  на пряму  $AB$ , при цьому вершини  $A, B$  належать на відрізку  $P_1 T_1$ . Доведіть, що центр описаного кола  $\Delta P_1 K T_1$  лежить на прямій, що містить середню лінію  $\Delta ABC$ , яка паралельна стороні  $AC$ .

(Тригуб Антон)

**Відповідь:** таких чисел не існує.

**Розв'язання.** Позначимо через  $B_1$  – проекцію вершини  $B$  на пряму  $l$  (рис. 13), тоді чотирикутники  $BB_1PP_1$  та  $TKAT_1$  вписані з діаметрами  $BP$  та  $AT$ . Тоді маємо такі рівності кутів:

$$\begin{aligned} \angle P_1B_1K &= \pi - \angle P_1B_1P = \pi - \angle P_1BP = \angle ABP = \pi - \angle ATP = \pi - \angle ATK = \\ &= \pi - \angle AT_1K = \pi - \angle PT_1K, \end{aligned}$$

Звідси випливає, що чотирикутник  $P_1B_1KT_1$  – вписаний, тому центр кола, що описаний навколо  $\Delta P_1KT_1$ , лежить на серединному перпендикулярі до відрізка  $B_1K$ . Але зрозуміла, що саме на цьому перпендикулярі і лежить середня лінія  $\Delta ABC$ , що паралельна стороні  $AC$ , що й треба було довести.

**4. Знайдіть усі пари натуральних чисел  $(m, n)$ , що задовольняють рівнянню**

$$m! + n! = m^n + 1.$$

Тут через  $k!$  для натурального числа  $k$  позначений добуток  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k$

(Чорний Максим)

**Відповідь:** (1; 1), (2; 1), (5; 3).

**Розв'язання.** Перебираючи тривіальні випадки  $m = 1$ ,  $n = 1$  та  $n = 2$ , знаходимо перші два з наведених розв'язків. Надалі вважатимемо, що  $m \geq 2$  та  $n \geq 3$ .

**Крок 1.** Доведемо, що  $m > n$ .

Якщо припустити, що  $n \geq m$ , то маємо, що числа  $m!$ ,  $n!$  та  $m^n$  кратні  $m$ , а отже, йому кратне і число  $m! + n! - m^n = 1$  – суперечність. Зокрема з цього випливає, що  $m \geq 4$ .


**Крок 2.** Тепер покажемо, що  $n > \frac{1}{2}m$ .

З відомої нерівності  $m! > m^{\frac{1}{2}m}$ , що випливає з нерівності між середніми, маємо що  $m^n + 1 = m! + n! > m^{\frac{1}{2}m} + 1$ .

**Крок 3.** Покажемо, що  $m$  просте.

Якщо це не так, то  $m$  має простий дільник  $p$ , що не перевищує  $\frac{1}{2}m$  і, відповідно,  $n$ . У такому випадку  $p$  є дільником числа  $m! + n! - m^n = 1$  – суперечність.

**Крок 4.** Доведемо, що  $m - 1$  – або просте число, або квадрат простого. Припустимо, що це не відповідає дійсності. У такому випадку ми можемо розкласти  $m - 1$  як добуток двох дільників  $a \neq b$ , менших за  $\frac{1}{2}m$  і тому менших за  $n$ . Звідси маємо, що  $m!$  та  $n!$  діляться на  $n - 1 = ab$ , оскільки  $n!$  містить у своєму розкладі обидва множники), а  $m^n + 1 = ((m - 1) + 1)^n + 1$  дає при діленні  $m - 1$  на остачу 2. Отже,  $m - 1$  є дільником 2, але це неможливо, оскільки за припущенням ми завжди маємо  $m \geq 4$ .



**Рис. 13**

З результатів *Кроків 3 і 4* та з міркувань парності випливає, що єдиним можливим випадком є  $m = 5$ . Справді, оскільки  $m \geq 4$  – просте, то воно непарне, тому  $m - 1$  – парне і може бути квадратом простого числа, якщо то число є 2. З результатів *Кроків 1 і 2* маємо, що розв'язками можуть бути лише такі пари (5; 3) та (5; 4). Безпосередньою перевіркою переконуємося, що тільки перша з них задовольняє початкове рівняння.

**3.1.** Відомо, що у трикутнику  $ABC$  найменшою стороною є  $BC$ . Нехай  $X, Y, K$  та  $L$  – точки на сторонах  $AB, AC$  та на променях  $CB, BC$  відповідно такі, що  $BX = BK = BC = CY = CL$ . Пряма  $KX$  перетинає пряму  $LY$  у точці  $M$ . Доведіть, що точка перетину медіан  $\triangle KLM$  співпадає з центром вписаного кола  $\triangle ABC$ .


**Розв'язання.** Оскільки  $\angle ABC$  зовнішній кут рівнобедреного  $\triangle XKB$  з вершиною  $B$  (рис. 14), пряма  $KX$  паралельна бісектрисі кута  $\angle ABC$ .

Відношення  $LB : LK = 2 : 3$  означає, що бісектриса  $\angle ABC$  проходить через центроїд  $\triangle KLM$ . Якщо ми позначимо  $LL_1$  його медіану та  $L_2$  її перетин з бісектрисою  $\angle ABC$ , ми отримаємо з подібності  $\triangle LBL_2 \sim \triangle LKL_1$  (за двома кутами) рівність

$$\frac{LL_2}{LL_1} = \frac{LB}{LK} = \frac{2}{3}.$$

Отже, точка  $L_2$  ділить медіану  $LL_1$  у такому самому співвідношенні, як і центроїд, а значить вона і є центроїдом  $\triangle KLM$ .

Аналогічно, бісектриса  $\angle BCA$  проходить через центроїд трикутника  $\triangle KLM$ . А отже, факт, що перетин бісектрис є інцентром трикутника, доводить твердження задачі.



**Рис. 14**

**4.1.** Для яких натуральних  $n \geq 2$  існують  $n$  непарних не обов'язково різних чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , для яких вираз  $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2$  є квадратом натурального числа?

**Відповідь:** для усіх чисел  $n$ , що мають вигляд  $8k + r$ , де  $k$  – натуральне та  $r \in \{0, 1, 4\}$ .

**Розв'язання.** Добре відомо, що квадрат цілого числа має остачі 0, 1 або 4 при діленні на 8. Таким чином лише для чисел  $n$ , що дорівнюють  $8k + r$ , де  $r \in \{0, 1, 4\}$ , відповідні числа можуть існувати. Покажемо, як їх можна підібрати.

$$n = 4t, a_1 = \dots = a_{n-1} = 1, a_n = (2t - 1): a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = (4t - 1) \cdot 1^2 + (2t - 1)^2 = (2t)^2.$$

$$n = 8t + 1, a_1 = \dots = a_{n-1} = 1, a_n = (2t - 1): a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = (8t) \cdot 1^2 + (2t - 1)^2 = (2t + 1)^2.$$